

監修

京都府立医科大学 眼科 講師 渡辺 彰英 先生


九州大学 眼科 診療講師 田邊 美香 先生

効果

この薬は、後天性眼瞼下垂の治療に使う点眼薬です。
効果は一時的ですので、長期に効果を得たい場合は継続して点眼する必要があります。医師の指示に従って正しくお使いください。

はたらき

上まぶたを上げる筋肉のひとつであるミュラー筋を収縮させることで、まぶたを上げます。



使いかた

通常、成人には、1回1滴、
1日1回点眼してください。



ご使用時の注意事項

- アップニーク®ミニ点眼液に含まれる成分に過敏症が起きたことのある方は、使用できません。
- 次の方は、注意が必要です。医師にご相談ください。
 - ・ 心臓や血管の疾患がある
 - ・ 閉塞隅角緑内障である
 - ・ 妊娠または妊娠している可能性がある
 - ・ 授乳中である
 - ・ 他に薬を使用している
- 副作用として、まぶたのかゆみがみられることがあります。点眼後、一時的に目がかすんだり、まぶしく見えたりすることがあります。このような症状が認められた場合には、医師に相談してください。
- 治療中は、定期的に眼科を受診してください。
- 使用し忘れた場合でも、1回に2滴点眼したり、1日に2回点眼しないでください。その日のうちに気づいた場合は、すぐに1回1滴を点眼してください。翌日に気づいた場合には、前日の分は点眼せず、1回1滴を1日1回点眼してください。